

Szczepienie przeciwko	Pierwsze szczepienie u szczeniąt poniżej 16 tygodnia życia	Pierwsze szczepienie u szczeniąt powyżej 16 tygodnia życia	Zalecenia dotyczące podawania kolejnych dawek szczepionki	Uwagi
Parwovirus (CPV-2)	Szczepienie w wieku 6-8 tygodni następnie co 3-4 tygodnie do wieku 14-16 tygodni	Dwie dawki w odstępie co 3-4 tygodnie	Dawka przypominająca po 12 miesiącach	Zwykle stosowane łącznie w jednym szczepieniu szczepionka polowalentna zawierająca kilka antygenów
Wirus nosówki	Szczepienie w wieku 6-8 tygodni następnie co 3-4 tygodnie do wieku 14-16 tygodni	Dwie dawki w odstępie co 3-4 tygodnie	Dawka przypominająca po 12 miesiącach	
Adenowirus typu 2	Szczepienie w wieku 6-8 tygodni następnie co 3-4 tygodnie do wieku 14-16 tygodni	Dwie dawki w odstępie co 3-4 tygodnie	Dawka przypominająca po 12 miesiącach	
Wirus parainfluenzy	Szczepienie w wieku 6-8 tygodni następnie co 3-4 tygodnie do wieku 14-16 tygodni	Dwie dawki w odstępie co 3-4 tygodnie	Dawka przypominająca po 12 miesiącach	
Leptospira		Szczepienie w wieku 12-16 tygodni następnie za 3-4 tygodnie	Powtórzyć po 6-9 miesiącach	
Wścieklizna		Szczepienie jednorazowe w wieku do 4 miesiąca życia	Powtarzać co 12 miesięcy	Szczepienie obowiązkowe

Szczepienie przeciwko	Pierwsze szczepienie u kociąt poniżej 16 tygodnia życia	Pierwsze szczepienie u kotów powyżej 16 tygodnia życia	Zalecenia dotyczące podawania kolejnych dawek szczepionki	Uwagi
Wirus panleukopeni	Pierwsza dawka w wieku 8-9 tygodni następna za 3-4 tygodnie następna w wieku 16 tygodni	Dwie dawki w odstępie 3-4 tygodni	Powtórzyć po 12 miesiącach	Zwykle stosowane łącznie w jednym szczepieniu szczepionka polowalentna zawierająca kilka antygenów
Herpeswirus	Pierwsza dawka w wieku 8-9 tygodni następna za 3-4 tygodnie następna w wieku 16 tygodni	Dwie dawki w odstępie 3-4 tygodni	Powtórzyć po 12 miesiącach	
Kaliciwirus	Pierwsza dawka w wieku 8-9 tygodni następna za 3-4 tygodnie następna w wieku 16 tygodni	Dwie dawki w odstępie 3-4 tygodni	Powtórzyć po 12 miesiącach	
Wirus wścieklizny	Dawka w wieku co najmniej 8 tygodni	Dawka w wieku co najmniej 8 tygodni	Zwykle co 2 do 4 lat zależnie od użytej szczepionki	
Wirus białaczki	Pierwsza dawka w wieku 8 tygodni kolejna za 3-4 tygodnie	Dwie dawki co 3-4 tygodnie	Co 12 miesięcy	
Chlamydophyla felis	Pierwsza dawka w wieku 9 tygodni kolejna co 3-4 tygodnie	Dwie dawki w odstępie 3-4 tygodni	Szczepienie co 12 miesięcy	